



# SGL Saatgut<sup>plus</sup> Beize

Grundstein des ackerbaulichen Erfolgssystems.

Keine Kompromisse. Von Anfang an.

# Warum die Zusatzbeize so wichtig ist.



Alles "rausholen".



- •Erhöht die Vitalität und Widerstandsfähigkeit des Getreides.
- •Fördert das Wurzelwachstum und damit das Nährstoffaneignungsvermögen (s. Bild).
- •Einfach anzuwenden.
- Optimierte Beizqualität.

Sorte: SU Ellen

Aussaat: 30.09.2018

Foto: 17.10.2018

2 Pflanzen links: mit SGL Saatgut<sup>plus</sup>

2 Pflanzen rechts: ohne

# SGL Saatgut<sup>plus</sup> Beize.

SG Saaten
Getreide
Landhandel

Keine Kompromisse. Von Anfang an.

- Die SGL Saatgut plus Beize ist der Grundstein des ackerbaulichen Erfolgssystems.
- Sie gibt der Pflanze optimale Startbedingungen.
- Besonders unter trockenen Witterungsbedingungen spielt die Beize ihre Vorteile aus.
- •Neben einer Ertragsabsicherung wird gleichzeitig die innere Qualität des Produktes gefördert und abgesichert.




# Praxisergebnisse.

Am Puls der Zeit.



#### **SGL-Anwendungsversuch Winterweizen 2018**

Saatgutwirtschaft Lichtschläger, 50374 Erftstadt-Gymnich Mehrfaktorielle Anlage mit Kerndrusch (n = 48): 3 Beizsysteme, 2 beizsystemangepasste Saatstärken, 2 Pflanzenschutzsysteme, 4 Düngungsstufen



- •SGL Saatgut plus überzeugt bei moderaten Saatstärken im Kornertrag.
- Erhöhte Saatstärken mit Standardbeizen bringen keinen Vorteil.


# Praxisergebnisse.

Am Puls der Zeit.



### SGL-Anwendungsversuch Winterweizen 2018

Saatgutwirtschaft Lichtschläger, 50374 Erftstadt-Gymnich Mehrfaktorielle Anlage mit Kerndrusch (n = 48): 3 Beizsysteme, 2 beizsystemangepasste Saatstärken, 2 Pflanzenschutzsysteme, 4 Düngungsstufen



SGL Saatgut<sup>plus</sup> Beize. Keine Kompromisse. Von Anfang an.


- SGL Saatgut plus überzeugt auch in der Steigerung der Produktqualität.
- Der Rohproteingehalt wird unabhängig von der Düngungsintensität gesteigert.
- Besonders in extensiven Anbausystemen spielt die Beize durch das vergrößerte Wurzelsystem ihre Vorteile aus.

# **Beizversuch Winterweizen 2020**



Vergleichsbetrachtung Zusatzbeizen

(Aussaat: 26.10.2019 Sorte: Boss; n=104)




# **Beizversuch Wintergerste 2020**



Vergleichsbetrachtung Zusatzbeizen

(Aussaat: 5.10.2019; Sorte: KWS Higgins; n = 18)

#### ■ Beizaustattung 200 ml Rubin TT



# Biostimulantien schlummerndes Potenzial?

Die Wirkung von Biostimulantien ist umstritten. Es mangelt an wissenschaftlichen Beweisen. Forscher der Uni Kiel präsentieren nun erste Ergebnisse eines Langzeitversuches mit Phosphit.



**UNSER AUTOR** Prof. Dr. Joseph-Alexander Verreet,

flanzenschutz und Düngemittel stehen zunehmend in der gesellschaftlichen Kritik. Die Politik reagiert darauf mit umfangreichen gesetzlichen Einschränkungen, um die Einträge in die Natur zu reduzieren. Gleichzeitig spezialisieren sich die Betriebe und haben die Fruchtfolge lange eingeengt. Dadurch sind die Erträge seit Jahren stagnierend oder sogar rückläufig. Die Frage, die sich den Landwirten stellt: Wie können trotz dieser Entwicklung Erträge in hoher Qualität und Menge wirtschaftlich sichergestellt werden - gibt es neue Wege?

# BIOSTIMULANTIEN ALS AUSWEG?

Zukünftig könnten sich sogenannte Biostimulantien zu einem wichtigen Baustein im integrierten Pflanzenbau entwickeln, um den Ertrag zu sichern und die Nährstoffeffizienz zu steigern. Das zeigt z.B. der dargestellte Langzeitversuch mit Phosphit. Der wesentliche Unterschied von Biostimulantien zu Pflanzenschutz- oder Düngemitteln besteht darin, dass ein Effekt nicht durch die Substanz direkt entsteht. Vielmehr lösen sie bestimmte Reaktionen innerhalb der Pflanze aus und wirken somit indirekt. Insgesamt können Biostimulantien ganz unterschiedliche Wirkungen hervorrufen, wie gesteigertes Wurzelwachstum, bessere Nährstoffverfügbarkeit, höhere Erträge, besserer Schutz vor Wetterextremen wie z.B.Trockenheit oder Steigerung von Qualitätsmerkmalen.

Die Uni Kiel belegte in einem Langzeitrsuch die positive Wirkung von Phosphit den Schotenansatz im Raps.

Biostimulatoren sind nicht neu im Ackerbau, führten aber in der Vergangenheit eher ein Nischendasein, da es ausreichend Alternativen gab. Die zunehmenden Probleme im Ackerbau rücken sie aber weiter in den Fokus.

#### IST DER HYPE BERECHTIGT?

Diese Frage stellte sich 2004 auch das Institut für Phytopathologie der Uni Kiel. Man war davon überzeugt, dass nur wissenschaftliche Belege eine breite Akzeptanz für diese Produktgruppe schaffen können. Die Wissenschaftler starteten mit Phosphit, der reduzierten Form des Phosphates, fortlaufende Feldversuche im Raps. Das Ergebnis: Ein fungizider Einfluss zeigte sich zwar nicht. Aber der Rapsertrag lag im Mittel von 14 Jahren um 2,45 dt/ha höher, als die unbehandelte Kontrollvariante. Der Raps nutzte das Nährstoffangebot besser aus und setzte zudem mehr Schoten an.

Die Gründe, warum man sich an der Kieler Uni auf eine anorganische Verbindung konzentrierte war, dass hier alle Produktinhaltsstoffe messtechnisch exakt erfasst werden können und die Umweltbedingungen bei der Ausbringung eine nicht so große Rolle spielen, wie bei sogenannten biologischen Präparaten (Algenextrakte oder Mikroorganismen). Auf Phosphit fiel die Wahl, da bereits in den 90iger Jahren internationale Studien von positiven Effekten der reduzierten Form von Phosphat berichteten. Die Blätter und Wurzeln nehmen Phosphit ähnlich schnell auf, wie das Phosphat aus den Grundnährstoffdüngern. Jedoch ist die Düngewirkung des Phosphits als gering einzustufen, da die Pflanze es nicht zu Phosphat umwandeln kann. Dennoch

#### SCHNELL GELESEN

Biostimulantien rücken stärker in den Fokus, seit Erträge durch enge Fruchtfolgen und weniger Pflanzenschutzwirkstoffe stagnieren.

Ein Langzeitversuch der Uni Kiel zeigt jetzt Potenzial von Phosphit auf.

Phosphit steigert den Ertrag von Raps im Mittel um 2,45 dt/ha und von Kartoffeln um 42.5 dt/ha.

Weizen reagiert auf Phosphit mit stärkerem Wurzelwachstum

Forschungszeit verschenkt: Bisher gibt es wenig belastbare Ergebnisse darüber, wie Biostimulantien wirken.

erschienen zahlreiche Publikationen in den letzten Jahrzehnten, die von einem gesteigerten Ertrag sowie einer verbesserten Blüte und Fruchtausbildung berichteten. Daher galt es, wissenschaftlich zu erforschen, welche Ursachen hinter diesen positiven Effekten stehen.


#### ERGEBNISSE LANGJÄHRIGER RAPSVERSUCHE

Seit nunmehr 14 Jahren haben die Kieler Forscher Raps mit einer Spezialformulierung aus Kaliumphosphit und Ammoniumstickstoff behandelt. Der Phosphorgehalt des Phosphits entspricht 38 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Das verwendete Produkt stammt ursprünglich aus den USA und wird hierzulande unter der Produktbezeichnung "Nutri-Phite Magnum S" vertrieben. Unter einer Vielzahl von phosphithaltigen Präparaten entschieden sich die Kieler Wissenschaftler für dieses Produkt, da es das Mittel mit der poten-

#### ÜBERS. 1: DAS LEISTET PHOSPHIT IM RAPS

	Mittelwert	Minimum	Maximum
Kontrolle (praxisüblich, jeweils ohne Biostimulator)	44,27 dt/ha	34,98 dt/ha	61,10 dt/ha
Nutri-Phite Magnum S (0,5 I/ha im Herbst und Frühjahr)	46,72 dt/ha	35,45 dt/ha	63,40 dt/ha
Ertragsdifferenz	2,45 dt/ha	0,41 dt/ha	5,90 dt/ha
monetärer Nettomehrerlös (35,00 €/dt Raps, 28,50 €/l Nutri-Phite Magnum S)	57,25 €/ha	-14,15 €/ha	178,00 €/ha
n = 21 Versuche	top agrar; Quelle: Uni Kiel, Phytopathologie		

△ Phosphit steigerte den Ertrag im Mittel um 2,45 dt /ha und den Nettoerlös um 57,25 €/ha. Die Mittelkosten belaufen sich auf 28,50 €/l.



- » Breiteste Wirkung gegen Gräser und Unkräuter
- Nachhaltig erfolgreich in der Fruchtfolge
- > Unschlagbar bei Problemund Wurzelunkräutern

www.nufarm.de Hotline: 0221 179179-99



#### ÜBERS. 2: AUS DEM ERTRAG BERECHNETER N-ENTZUG

 
 Kornertrag
 N-Entzug Korn

 Kontrolle
 44,27 dt/ha
 148,30 kg/ha

 NPMS H+F
 46,72 dt/ha
 156,51 kg/ha

 Differenz
 +2,45 dt/ha
 +8,21 kg/ha

 $\Delta$  Bei gleicher Düngung resultieren aus dem Mehrertrag höhere N-Entzüge.

Quelle: Uni Kiel, Phytopathologie



testen Formulierung und der höchsten Wirkstoffeffektivität war.

Der Exaktversuch mit jeweils vier Wiederholungen wurde auf dem schleswig-holsteinischen Versuchsgut Hohenschulen der Uni Kiel durchgeführt. Die langjährige Versuchsanlage bestand aus:

- einer Herbstbehandlung mit 0,5 l/ha zur Zeit des 4-Blattstadiums,
- einer Behandlung im Frühjahr mit ebenfalls 0,5 l/ha zum Beginn des Streckungswachstums,
- einer unbehandelten Kontrollvariante als Vergleich,
- einer ansonsten einheitlichen praxisüblichen Bestandesführung.

Die Parzellen wurden auf Wurzelhalsund Stängelfäuleerreger, Rapskrebs und

nach neun Tagen

Kontrolle

2300

2200

2100

2000

1900

1800

ÜBERS. 3: EINFLUSS VON PHOSPHIT AUF NITRATREDUKTASE IM RAPS

1,3 ml

ab 4-Blattstadium 0,5 l/ha + Frühjahr, Beginn Streckungswachstum 0,5 l/ha

 $\Delta$  Phosphit regt die Nitratreduktase und damit die Anlage von Ertragsorganen im Raps an.

Blattbehandlung mit Nutri-Phite Magnum S im Herbst

2,5 ml

Nutri-Phite Magnum S

Absolute Nitratreduktaseaktivität, 540 nm

Verticillium-Welke von Anfang Oktober bis Vegetationsende hinsichtlich Befallsstärke und -häufigkeit vergleichend zur unbehandelten Kontrolle bonitiert. Während Phoma das Befallsgeschehen dominierte, und sich Verticillium-Welke mit höheren Befallswerten zum Vegetationsende zeigte, trat Rapskrebs nur mit einer geringen Befallshäufigkeit von maximal 3 % auf. Im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle wies die Phosphitbehandlung keine Unterschiede im Befall und somit keine fungizidähnliche Wirkung auf.

Des Weiteren verglich das Kieler Team die Schotenzahl je Pflanze nach Phosphitbehandlung mit der unbehandelten Kontrolle. Dabei kam heraus: Im

top agrar

5,0 ml

Mittel der Jahre bildete der Haupttrieb zwei, der erste Nebentrieb vier und der zweite Nebentrieb fünf Schoten mehr pro Pflanze. Daraus resultiert der mittlere Mehrertrag von 2,45 dt/ha verglichen zur unbehandelten Kontrolle. Unterstellt man einen Rapspreis von 35 €/dt, würde das einen monetären Mehrerlös von rund 85,75 €/ha bedeuten. Der Biostimulator Nutri-Phite Magnum S kann mit den gängigen Pflanzenschutzmaßnahmen ausgebracht werden. Kosten für eine extra Überfahrt fallen nicht an. Das Präparat schlägt mit einem Nettopreis von 28,50 €/1 zu Buche (Übers. 1, Seite 57).

Die Versuche offenbaren eine weitere Erkenntnis: Der Raps nutzt durch die Behandlung mit Phosphit, die zur Verfügung gestellten Nährstoffe effizienter aus. Bei gleicher Düngung und einem Mehrertrag im Schnitt von 2,45 dt/ha zur unbehandelten Kontrolle, konnten 8,2 kg N/ha mobilisiert und geerntet werden (Übers. 2). Das Rapskorn enthält ca. 3,35 kg N/dt. Der Ertragszuwachs und die höhere N-Abfuhr spre-

#### SO WIRKT PHOSPHIT

Nachdem sich die positiven Effekte einer Phosphitbehandlung belegen ließen, stellt sich die Frage, welchen Einfluss Phosphit auf den pflanzenphysiologischen Stoffwechsel ausübt bzw. wodurch sich die Positivwirkungen erklären lassen.

chen für eine verbesserte N-Effizienz.

Internationale Studien deuteten bereits an, dass die Ursache im Bereich der Pflanzenhormone und den davon abhängigen Enzymen zu suchen ist. Da Nitratreduktase ein Schlüsselenzym in der Stickstoffverwertung der Pflanze

ses Enzym. Die Nitratreduktase dient der Pflanze, Stickstoffquellen für den Aufbau der Pflanzenorgane (Wurzel, Stiel, Blatt, Frucht) zu mobilisieren. Dementsprechend müsste eine erhöhte Nitratreduktaseaktivität dazu führen, dass die Pflanze diese Organe verstärkt bildet.

darstellt, legte man den Fokus auf die-

Um dieser Vermutung nachzugehen, legten die Wissenschaftler im Labor Versuche an. Sie zogen die Pflanzen in einem Spezialboden auf. Anschließend besprühten sie sie mit unterschiedlichen Phosphitmengen. In gestaffelten Zeitabständen untersuchten Mitarbeiter die Aktivität der Nitratreduktase. An den mit Phosphit behandelten Rapspflanzen zeigte sich am neunten Tag nach der Applikation im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle, eine um bis zu 8 % höhere Nitratreduktaseaktivität (Übers. 3).

#### ÄHNLICHE WIRKUNG IM WEIZEN

Nachdem die stimulierende Wirkung im Raps sowohl mehrjährig im Feld als auch unter konstanten Bedingungen im Gewächshaus nachgewiesen werden konnte, interessierte die Wissenschaftler, ob auch im Weizen das phosphithaltige Präparat die Nitratreduktase steigert. Dem war so!

Die im Labor mit Phosphit (Nutri-Phite Magnum S) behandelten Weizenpflanzen weisen am fünften, siebte und neunten Tag nach der Applikation, vergleichend zur unbehandelten Kontrolle, eine um bis zu 10 % gesteigerte Nitratreduktaseaktivität auf (Übers. 4). Bestätigt sich dies Erkenntnis auch im Feld?


In einem dreijährigen Feldversuch in Schleswig-Holstein (Gut Panker/Schmoel) wird derzeit untersucht, inwieweit eine Phosphitbeize (Nutri-Phite Magnum S mit 30 ml/dt Saatgut) das Wurzelwachstum von Weizen fördert. In je vier Wiederholungen entnahmen Versuchstechniker mit Hilfe eines Stechzylinders (Durchmesser 8,5 cm, Tiefe 30 cm) aus den Parzellen, jeweils zufällig von zehn Pflanzen oberirdische Pflanzenteile und Wurzelmasse.

Die ersten Ergebnisse zeigen, dass Phosphit die frühe Wurzelentwicklung positiv beeinflusst. Die Wurzelmasse war neun Wochen nach der Aussaat (EC 20, 7.12.2019) um 7,4 % und im Frühjahr (EC 29, 3.4.2019) um 50 % höher als die Variante ohne Phosphit. Ob sich mit der höheren Wurzelmasse auch der Ertrag steigern lässt, müssen weiteren Auswertungen zeigen.

Dennoch beweisen die ersten Ergebnisse die positiv stimulierende Wirkung von Phosphit.

#### **AUCH KARTOFFELN PROFITIEREN**

Unabhängig von der Uni Kiel testete die Kürzinger agro nord GbR in Groß Lüsewitz elf Jahre lang (2008–2018) in 46 Versuchen mit zwölf verschiedenen Sorten die Wirkung von Phosphit



 $\triangle$  Im Weizen stieg die Nitratreduktaseaktivität durch Phosphit ebenfalls an und führte zu stärkerem Wurzelwachstum.

# topagrar

# top agrar Badetücher

100 % Baumwolle | Walk-Velours in hochwertigem Ringgarn (380 g/m²) | Maße: 150 x 75 cm



"Agriculture" € 24,90 | Art.-Nr.: 080440 top agrar-Abonnentenpreis € 19,90



"Kuh" € 19,- | Art.-Nr.: 047876 top agrar-Abonnentenpreis € 16,-

"Strandtrecker" € 19,– | Art.-Nr.: 047877 top agrar-Abonnentenpreis € 16,–



- shop.topagrar.com 0 0 25 01/801 30 20
- @ buchvertrieb@topagrar.com

(Nutri-Phite Magnum S) in Kartoffeln. Auch hier erfolgte die Bestandesführung praxisüblich. Ein robustes Fungizidregime schaltete Phytophthora als Einflussfaktor aus.

Die größten Effekte zeigten sich bei einer kombinierten Knollen- und Blattbehandlung. Dazu applizierten die Versuchsansteller 0,3 l/t auf die Knolle. Später folgten zwei Blattbehandlungen mit 1,5 l/ha zum Hakenstadium bzw. Beginn Knollenansatz sowie 0,7 l/ha ca. 14 Tage später.

Der Phosphiteinsatz erhöhte den Nettoertrag (Fraktion > 35 mm) im Mittel der Jahre durch die kombinierte Knollen- und Blattbehandlung um 42,5 dt/ha im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle. Auch der Stärkegehalt entwickelte sich positiv. Im Schnitt der Sorten stieg er um 0,7 % (Stärkeertrag + 9,9 dt/ha). Dabei reagierten die Sorten, je nach Verarbeitungsrichtung, durchaus unterschiedlich: + 0,6 % bei Agria (Industrie), + 1,4 % bei Fasan (Speise) und + 1,1 % bei Jasia (Stärke). Der gestei-

gerte Ertrag führte damit nicht zu einem Qualitätsverlust (Verdünnungseffekt). Im Mittel der Jahre konnte die Phosphitanwendung 15,3 kg N/ha mehr aus dem Boden mobilisieren.

Die langjährigen Versuche zeigen, dass bestimmte Biostimulantien durchaus eine Wirkung entfalten können.

@ anne-katrin.rohlmann @topagrar.com

#### GESETZESLAGE

# Rahmenbedingungen uneinheitlich

Die Biostimulatoren lassen sich, je nach Herkunft, in vier verschiedene Hauptgruppen unterteilen, die weit aufgefächert sind:

- Mikroorganismen
   Natürliche Verbindungen,
- 2. Natürliche Verbindungen, wie Seetang und Algen

**3.** Organische Verbindungen, wie Aminosäuren, Humin- und Fulvosäuren **4.** Anorganische Verbindungen.

Rein rechtlich sind Biostimulantien in Deutschland bisher bei den Pflanzenstärkungsmitteln, den Pflanzen- oder Bodenhilfsstoffen angesiedelt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass Biostimulantien weder einen direkten Düngeeffekt, noch eine direkte zielgerichtete Wirkung auf Schädlinge und Pflanzenkrankheiten aufweisen. Doch diese nationale Einteilung war immer nur eine "Notlösung". Jede Nation innerhalb der EU verfährt zudem unterschiedlich, was das europäische Marktgeschehen in der Vergangenheit erheblich verzerrte. Gleichzeitig bremste die rechtliche Unsicherheit weitere Innovationen und Forschungstätigkeit in diesem Bereich aus. Daher sollen zukünftig die Biostimulantien in der EU eine einheitliche Klassifizierung erfahren. Dieser Bereich wird in der zukünftigen EU-Düngemittelverordnung eine eigene Produktgruppe erhalten.

## KOMMENTAR

# Die Forschung hat Zeit verschenkt

Erträge sichern, Nährstoffeffizienz verbessern, Wurzelwachstum fördern das Institut für Phytopathologie hat die Chancen von Biostimulatoren schon vor über 15 Jahren erkannt und untersucht seither verschiedene Stoffe. Insbesondere anorganische Verbindungen brachten sehr interessante physiologische Effekte hervor, die es weiter zu erforschen gilt. Damit Biostimulantien den Einzug in den klassischen Ackerbau finden, sind wissenschaftliche Belege über die Wirkmechanismen zwingend notwendig. Die mehrjährigen Feldversuche in Raps, Weizen und Kartoffeln belegen auf wissenschaftlicher Basis das Potential der Biostimulatoren. Mit den Versuchsergebnissen konnten viele international beschriebene Beobachtungen bestätigt und erklärt werden.

Diese stimulierenden Effekte zu nutzen, kann für die praktische Landwirtschaft durchaus von Vorteil sein. Oftmals werden durch Unsicherheit und Unkenntnis diese Chancen von Be-

ratung und staatlichen Stellen aber zu wenig genutzt. Das Nichtbeachten von möglichen Effizienzsteigerungen in der Nährstoffversorgung und den daraus resultierenden Ertrags- und Umwelteffekten ist umso bedauerlicher, da die Chancen der bisherigen Pflanzenhilfsmittel bzw. -stärkungsmittel schon lange bekannt sind. Innovativ zu forschen wurde dadurch versäumt. Das hat dazu geführt, dass es zwar viele Anbieter in diesem Segment gibt, aber wenig umfangreiche und wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse hinsichtlich Wirkung, Wirkungssicherheit und Wirkungsmechanismus.


Obwohl Europa auf diesem Sektor mit über 200 Herstellem breit aufgestellt ist, ist wichtige Forschungszeit in der Vergangenheit verschenkt worden. Europäische Firmen sind weltweit führend im Bereich der Biostimulatoren und erreichten im Jahr 2015 bereits einen Umsatz von über 578 Mio.€. Dieser Vorsprung an Know-how darf



Verreet, Uni Kiel

nicht leichtfertig verspielt werden und durch neue regulatorische Hemmnisse gefährdet werden.

Es gilt, das Erkenntnisdefizit abzuarbeiten und in einigen Bereichen "neu zu denken". Denn Biostimulantien wie Phosphit haben das Potential, sich in naher Zukunft, sowohl im konventionellen Pflanzenbau als auch bei alternativer Wirtschaftsweise, zu einer tragenden Säule im integrierten Pflanzenbau zu entwickeln.





### SGL Saatgut<sup>+</sup>. Dein Vorsprung durch innovative Beize.



SGL Saatgut + mit KANTOR® zur Beizoptimierung und Nutri-Phite® Magnum S zum schnellen Start von Anfang an veredelt. Das EXTRA für Ihre Saat.



### **KANTOR®**

All-In-One Additiv

#### Getreidebeizmittel optimieren!

- Verbessert Anhaftung (Wasserbeizen und Spurennährstoffe)
- Vermindert Staubabrieb (JKI und KWS anerkannte Qualität)
- Optimiert Beizqualität
- Kein Einfluss auf die Verträglichkeit



# **Nutri-Phite® Magnum S**

Jugendentwicklung beschleunigen

- Erhöht Vitalität und Widerstandsfähigkeit
  - Fördert Wachstum; Wurzelwachstum
    - Einfach anzuwenden (Mischbarkeit/Verträglichkeit)
    - Steigert Ertrag und Qualität

Anwendungshinweis und Dosierung in ml/100 kg Saatgut:

KANTOR®: 45 ml/100 kg



Nutri-Phite® Magnum S: 30 ml/100 kg

Sind problemlos mit wasserbasierten Beizmitteln mischbar.

### Ihre EXTRAS für 5,- €/100 kg Aufpreis















2 Schritte zum Spitzenertrag

SGL Saatgut

je 0,35 l/ha + EC 37-51 Nutri-Phite Magnum S

